

compreender a composição e o funcionamento do sistema respiratório humano, enfocando-se os males em consequência do uso do tabaco. Trata-se de ações educativas (palestras, dinâmicas, apresentação de peça teatral), pelas quais se busca sensibilizar o público-alvo a empreender medidas em prol da boa saúde respiratória individual e coletiva, no âmbito escolar e familiar.

### 198 Programa de ações integradas para prevenção e atenção ao uso de álcool e drogas/organização mundial da saúde-implementação de estratégias de diagnóstico e intervenções breves para problemas relacionados ao álcool

Erikson Felipe Furtado  
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto  
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (SSSP)  
Processo 2007/55397-1  
Vigência: 1/4/2008 a 31/10/2008

Os problemas relacionados ao álcool não se restringem a dados da OMS. Considerando o consumo de álcool como fator de risco, o Brasil situa-se entre os países com taxas Daly mais elevadas. Isto decorre do alto índice de lesões e agravos decorrentes de acidentes e violência, assim como dos altos índices de hospitalizações médicas e psiquiátricas, associados ao uso excessivo de álcool. As estratégias de diagnóstico e intervenções breves vêm sendo implementadas em serviços de atenção primária à saúde através de assessoria a gestores e cursos de capacitação para os profissionais de saúde nas regiões de Ribeirão Preto e São José dos Campos, SP. Este estudo objetiva avaliar o impacto dessas estratégias.

### 199 Estudo do impacto de diferentes métodos de terapia renal substitutiva na leptospirose grave na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Antônio Carlos Seguro  
Instituto de Infectologia Emílio Ribas  
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (SSSP)  
Processo 2007/55258-1  
Vigência: 1/4/2008 a 31/3/2010

A forma mais grave da Leptospirose, conhecida também como Síndrome de Weil, pode ser caracterizada por injúria pulmonar grave ou insuficiência renal aguda (IRA), associadas há um aumento da mortalidade. Estudos têm demonstrado que a dose da diálise pode afetar o prognóstico e a evolução dos pacientes em sepse. No entanto, o estudo dessa população em sepse é muito difícil, pois existe uma variabilidade muito grande das caracte-

terísticas dos pacientes e das doenças associadas, como, por exemplo, pacientes com distúrbios hematológicos, bronquíticos, portadores de insuficiência cardíaca, portadores de Aids, hepatopatas etc. É sabido que o aumento da dose de diálise melhora as condições metabólicas e os distúrbios hidroeletrólíticos. Os pacientes com leptospirose constituem uma população homogênea, geralmente sem comorbidades associadas, portanto se apresentando como um grupo ideal para testar esta hipótese. Recentemente, avaliamos os efeitos da dose de hemodiálise nesta população utilizando a hemodiálise clássica ou de baixa eficiência (Sled) comparando dois grupos tratados durante períodos diferentes. Nós preconizamos que a hemodiálise diária e precoce, associada ao uso de antibiótico é a melhor medida terapêutica na leptospirose grave. Propomos a estudar agora se diferentes métodos (hemodiálise ou hemofiltração) poderiam interferir na evolução e mortalidade dos pacientes com leptospirose grave.

### 200 A organização de políticas públicas relacionadas ao uso do tabaco

Ronaldo Ramos Laranjeira  
Escola Paulista de Medicina  
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)  
Processo 2006/51713-3  
Vigência: 1/12/2006 a 31/5/2007

Observando a tendência mundial de aumento do consumo, além da carência de serviços assistenciais direcionados aos fumantes, iniciou-se a organização de um ambulatório para implementar tratamentos baseados nas melhores evidências, que fará parte de um projeto temático, incluindo medidas preventivas de controle social como a implementação dos ambientes livres de tabaco, proibindo o uso do tabaco, em suas diferentes formas, em ambientes fechados e públicos, por meio de medidas legislativas e psicoeducacionais, assim como planejando a fiscalização da venda proibida de cigarros para menores de 18 anos nos estabelecimentos comerciais dos municípios parceiros do projeto.

### 201 Plano de prevenção do comportamento suicida

Neury José Botega  
Faculdade de Ciências Médicas  
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  
Processo 2003/07173-6  
Vigência: 1/3/2004 a 30/11/2004

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 1 milhão de pessoas morreram em todo o mundo cometendo suicídio no ano de 2000. Na maioria dos países,