

337 Promoção da saúde mental na estratégia da saúde da família: intervenção precoce visando à prevenção dos transtornos mentais e seu impacto socioeconômico

Eurípedes Constantino Miguel Filho
Faculdade de Medicina
Universidade de São Paulo (USP)
Processo 2009/53111-9
Vigência: 1/11/2010 a 31/10/2012

Os problemas de saúde mental começam na infância e são fruto de alterações do desenvolvimento cerebral. Uma vez instalados, eles se cronificam, de maneira que os tratamentos atuais são insuficientes para a remissão total dos sintomas. Estima-se que em 2020 os transtornos mentais representarão a principal causa de incapacitação dentre os problemas de natureza médica, acarretando um impacto econômico considerável, o que enfatiza a necessidade da intervenção precoce para mudança desse panorama. No Brasil, os recursos humanos são escassos: cerca de 300 psiquiatras especializados na Infância e Adolescência para atender a aproximadamente 9 milhões de crianças e adolescentes com transtorno mental moderado. Trata-se de elaborar uma estratégia para aumentar as chances de intervenção precoce e a capacitação de médicos do Programa de Saúde da Família (PSF) para o diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde mental em fases iniciais do seu desenvolvimento. Se essa estratégia se mostrar eficaz, e for custo-efetiva, poderá ser utilizada nacionalmente. Em 2004, Wissow desenvolveu metodologia de treinamento de médicos da atenção primária para manejo básico dos problemas de saúde mental em crianças e avaliação dos impactos do treinamento recebido, em relação ao prejuízo funcional e bem-estar das famílias dos pacientes acompanhados. O presente projeto tem por objetivo desenvolver e adaptar essa metodologia para depois aplicá-la em um grupo de médicos da família e comunidade e verificar o impacto da capacitação na detecção e acompanhamento de crianças com problemas de saúde mental na Região Oeste do Município de São Paulo. Além disso, pretende-se verificar o impacto deste treinamento na redução dos sintomas psicopatológicos, no uso de serviços de saúde e no desempenho escolar das crianças acompanhadas, comparando-as com aquelas submetidas a rotina tradicional do PSF. Em seguida, será realizada análise de custo-efetividade para avaliação do impacto econômico da intervenção proposta.

338 Avaliação de custos e efeitos incrementais da angiotomografia coronariana não invasiva usando tomografia computadorizada de 320 detectores (MDCT 320)

Carlos Eduardo Rochitte
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (SSSP)
2009/53100-7
Vigência: 1/7/2010 a 30/6/2012

Devido aos rápidos avanços de *software* e *hardware* dos computadores, o InCor-HC/FMUSP incorporou o primeiro tomógrafo computadorizado com 320 camadas de detectores (MDCT320) do Brasil. A avaliação precoce pode permitir modular sua incorporação no sistema de saúde. Estudo de custos e efeitos da MDCT320 comparativo com a angiografia coronariana convencional, para verificar se existe ou não estenose luminal coronariana 50% e/ou um defeito na perfusão do miocárdio em pacientes com dor torácica similar à angina, relativamente aos resultados do estudo anterior com o MDCT64.

339 Avaliação do impacto da implementação de diretrizes clínicas baseadas em evidências na qualidade da assistência aos pacientes internados com diagnósticos de diabetes mellitus, insuficiência cardíaca congestiva e pneumonia adquirida na comunidade

Lucieni de Oliveira Conterno
Faculdade de Medicina de Marília
Secretaria de Ensino Superior do Estado de São Paulo (SESSP)
Processo 2006/61909-2
Vigência: 1/5/2007 a 31/12/2008

Diretrizes clínicas baseadas em evidências (DCBE) podem ajudar a melhorar a qualidade da assistência. Para que isso ocorra, é necessário que se adotem estratégias apropriadas para sua implementação. Pacientes adultos com diagnóstico de DM, ICC e PAC são frequentemente internados, mas nem sempre recebem o cuidado baseado nas melhores práticas. Nosso objetivo é utilizar estratégias de consenso local, na definição, disseminação e avaliação de DCBE dirigidas a pacientes adultos com DM, ICC e PAC, numa enfermaria geral, e avaliar o impacto dessas DCBE na qualidade do processo assistencial. Será realizado um estudo de análise de série temporal, com os dados sendo coletados e comparados seis meses antes e após a intervenção.

340 Avaliação dosimétrica do tratamento ambulatorial do carcinoma da tireoide com atividades de 100 a 150 mCi de iodo-131

Carlos Alberto Buchpiguel
Faculdade de Medicina